

# Flore principale des zones humides du bassin de la Brèche

A photograph of a dense, wet forest. The ground is covered in fallen leaves, many of which are wet and glistening. The trees are thin and have a mix of green and brown foliage. The overall atmosphere is damp and overcast. The text "Boisements humides" is overlaid in the center of the image.

# Boisements humides

# Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*)

## ○ Description :

- Arbre assez élevé, à écorce brunâtre crevassée
- Jeunes rameaux glabres
- Bourgeons glabres, renflés, obtus
- Feuilles glutineuses, pétiolées, suborbiculaires ou obovales en coin, tronquées ou échancrées, irrégulièrement sinuées-dentées, vertes et glabres sur les faces, sauf les aisselles des nervures poilues, à 6-9 paires de nervures secondaires
- 3-6 chatons mâles
- Cônes ovoïdes, assez petites, pédoncules
- Fruit presque pentagonal, à aile coriace, plus étroite que la graine

○ Floraison : Février/avril

○ Fructification : Septembre/octobre



# Bourdaine (*Frangula alnus*)

## ○ Description :

- Arbrisseau haut de 2 à 6 mètres
- Ecorce du tronc caractéristique, grise, à intérieur pourpre taché de lenticelles claires
- Rameaux souples avec feuilles alternes pétiolées, ovales, d'un vert terne pour le dessus et luisant pour le dessous
- Fleurs, petites et verdâtres
- Fruits globuleux d'abord verts puis rouges et enfin noirs à maturité

## ○ Floraison : Avril/juillet




# Cardère poilue

(*Dispsacus pilotus* L.)

## Description :

- Plante bisannuelle de 1 à 2 mètres, à tige creuse, sillonnée, hérissée de fins aiguillons qui passent à des soies raides garnissant le bas des tiges et les pédoncules
- Feuilles ovales ou oblongues-acuminées, dentées, toutes pétiolées, faiblement aiguillonnées sur la nervure dorsale, munies à la base du limbe de 2 petites segments inégaux
- Fleurs d'un blanc jaunâtre, en têtes globuleuses de 2 cm de diam., d'abord penchées, puis dressées
- Folioles de l'involucre à la fin réfléchies, lancéolées-linéaires, un peu plus longues mais peu différentes des paillettes, comme elles spinescentes et hérissées de longues soies étalées

**Floraison :** Juin-septembre



# Cerisier à grappes, Putiet (*Prunus padus* L.)

## Description :

- Arbuste ou arbre (3-10 m), bois avec odeur désagréable après cassure (amande amère)
- Feuilles : alternes, ovales pointues (8-10 cm), dentées, avec 1-2 glandes nectarifères sur le pétiole, près du limbe
- Fleurs : longues grappes (10-15) pendantes, parfois dressées, blanches, très odorantes
- Fruits (juillet-septembre) : petit drupes en longues grappes, sphériques (8-9 mm de diamètre), rouge foncé puis noires à maturité, brillantes, jus rouge

Floraison : Mai-juin



# Circée de Paris (*Circaea lutetiana*)

## Description :

- Plante de 30-60 cm, assez ferme, pubérulente
- Feuilles opaques, ovales en cœur à la base, longuement acuminées, bordées de petites dents écartées, à pétiole non ailé, canaliculé en dessus, pubescent tout autour
- Fleurs petites, à pédicelles pubescents-glanduleux, sans bractées
- Pétales arrondis à la base
- Stigmate bilobé
- Capsule obovale en poire, persistante, hérissée de poils crochus hispides, à 2 loges égales

**Floraison :** Juin-septembre



# Fougère des marais

(*Thelypteris palustris*  
Schott)

## Description :

- Plante vivace de 40-80 cm, glabre, à souche grêle, traçante, noirâtre
- Feuilles longuement pétiolées, à pétiole et rachis nus, oblongues-lancéolées, peu atténuées à la base, bipennatiséquées, non glanduleuses en dessous
- Segments étroitement lancéolés, pennatifides, à lobes confluent à la base, triangulaires-lancéolés, aigus ou subobtus, entiers ou denticulés au sommet, à bords un peu roulés en dessous
- Sores petites, à la fin confluent, sur 2 lignes rapprochées des bords des lobes
- Indusie caduque

Floraison : Juin-septembre



# Groseillier noir, Cassis

(*Ribes nigrum* L.)

## Description :

- Sous-arbrisseau de 1 m. à 1 m. 50, non épineux, hermaphrodite, parsemé sur les feuilles en dessous, sur les bourgeons et sur les fruits de glandes jaunes odorantes
- Feuilles palmatilobées, à 3-5 lobes triangulaires, dentés, pubescentes en dessous
- Fleurs rougeâtres, en grappes axillaires toujours pendantes
- Bractées velues, lancéolées-aiguës, plus courtes que les pédicelles
- Calice en cloche, tomenteux en dehors, ponctué-glanduleux, à sépales oblongs, obtus, réfléchis en dehors
- Pétales obovales, deux fois plus courts que les sépales
- Baies noires, ponctuées, à saveur et odeur aromatiques

**Floraison :** Avril-mai



# Groseillier rouge

(*Ribes rubrum* L.)

## Description :

- Sous-arbrisseau
- Plante sous-frutescente ; petit arbrisseau inférieur à un mètre et dont l'extrémité des rameaux herbacés se dessèche chaque hiver : Sauge officinale, Lavande, Thym. de 1 m. à 1,5 m, non épineux, hermaphrodite
- Feuilles grandes, palmatilobées, à 3-5 lobes profondément dentés, pubescentes en dessous
- Fleurs d'un vert jaunâtre, en grappes axillaires toujours pendantes
- Bractées glabres, ovales-obtuses, bien plus courtes que les pédicelles
- Calice en coupe, glabre, à sépales obovales, obtus, plans
- Pétales en coin, beaucoup plus courts que les sépales
- Baies rouges, rarement blanchâtres, glabres, à saveur acide

Floraison : Avril-mai



# Houblon

(*Humulus lupulus* L.)

## Description :

- Plante vivace de 2-5 mètres, rude, à tiges herbacées, sarmenteuses-volubiles, rameuses
- Feuilles opposées, pétiolées, palmatilobées en cœur, à 3-5 lobes ovales-acuminés dentés, les supérieures souvent simples
- Fleurs vert jaunâtre, dioïques, les mâles en grappes rameuses, les femelles en cônes ovales, opposés, pédoncules, pendants
- Péricarpe mâle à 5 divisions égales, 5 étamines dressées à filets courts
- Fleurs femelles 2 à l'aisselle des écailles foliacées du cône, à longs stigmates filiformes
- Fruit ovoïde-comprimé, couvert de glandes jaunes aromatiques

**Floraison :** Juin-septembre



# Laiteron des marais

(*Sonchus palustris* L.)

## Description :

- Plante vivace à tige de 2-3 mètres, robuste, dressée, simple, glabre, poilue-glanduleuse au sommet
- Feuilles assez étroitement lancéolées, acuminées, indivises ou offrant de chaque côté vers la base ou au-dessous de leur milieu 1-2 ou 3 lobes profonds lancéolés, souvent réfléchis, denticulés, embrassantes, à oreillettes lancéolées, aiguës
- Involucre hispide-glanduleux
- Capitules pédoncules en corymbe étalé
- Akènes jaunâtres oblongs, subprismatiques, longs de 3 à 12 mm environ, faiblement striés transversalement
- Fleurs jaunes

**Floraison :** Juillet août



# Morelle douce-amère (*Solanum dulcamara* L.)

## Description :

- Sous-arbrisseau sarmenteux de 1-2 mètres, glabre ou pubescent, à écorce amère et à bois sucré, à rameaux herbacés, un peu volubiles, cylindriques
- Feuilles ovales-acuminées, souvent en cœur, entières ou les supérieures triséquées, les 2 segments latéraux plus petits
- Fleurs violettes, en cymes corymbiformes divariquées, multiflores, longuement pédonculées
- Calice vert, petit, à lobes courts
- Corolle de 12-20 mm, à lobes réfléchis, marqués chacun vers la base de 2 taches vertes
- Anthères jaunes
- Baies ovoïdes, rouges

**Floraison :** Juin-septembre




# Peuplier blanc (*Populus alba* L.)

## Description :

- Arbre élevé, à écorce lisse se crevassant assez tard en losanges, à rameaux étalés
- Bourgeons secs, tomenteux
- Jeunes pousses blanches cotonneuses, à feuilles palmatilobées
- Feuilles adultes ovales ou suborbiculaires, anguleuses ou sinuées-dentées, vertes en dessus, très blanches-tomenteuses en dessous
- Pétiole arrondi
- Chatons à écailles oblongues ou lancéolées, crénelées-dentées, velues-ciliées
- 8 étamines
- 4 stigmates en croix, jaunes
- Capsule ovoïde

Floraison : Mars-avril



# Peuplier noir (*Populus nigra*)

## ○ Description :

- Arbre élevé, à écorce se gerçant de bonne heure et en long, à rameaux étalés et arrondis
- Bourgeons et jeunes pousses glabres et très visqueux
- Feuilles deltoïdes ou ovales triangulaires acuminées, régulièrement crénelées-dentées tout autour, à dents conniventes, très glabres, vertes et luisantes sur les deux faces
- Pétiole comprimé au sommet
- Chatons à écailles laciniées-frangées, glabres
- 12-20 étamines
- 4 stigmates réfléchis, jaunes
- Capsule ovoïde-conique, à 4 sillons, s'ouvrant par 2 valves

## ○ Floraison : Mars/avril




# Ronce bleuâtre

(*Rubus caesius* L.)

## Description :

- Glaucéscent, muni de glandes et de petits aiguillons souvent courbés
- Feuilles velues sur les 2 faces, vertes ou grisâtres en dessous, à 3 folioles grossièrement dentées, les inférieures souvent lobées, la terminale ovale en cœur ou trilobée
- Inflorescence petite, en corymbe, à pédoncules grêles, garnis de glandes fines et de petits aiguillons
- Sépales verts, redressés, longuement acuminés
- Pétales blancs, larges
- Étamines égalant les styles
- Drupéoles 2-5, grosses, bleuâtres ou glauques, à saveur acide. Espèce très polymorphe, s'hybridant facilement avec la plupart des autres espèces du genre

**Floraison :** Juin-juillet



# Saule blanc

(*Salix alba*)

## ○ Description :

- Arbre de 6-25 mètres, à rameaux dressés, flexibles, pubescents ainsi que les feuilles dans leur jeunesse
- Feuilles adultes courtement pétiolées, lancéolées, acuminées, denticulées, à pointe droite ou peu déjetée, soyeuses-blanchâtres sur les deux faces ou au moins en dessous
- Chatons contemporains, cylindriques, pédoncules et feuilles, les mâles grêles, étalés-arqués, les femelles assez denses
- Ecailles ciliées, jaunâtres, caduques
- 2 étamines libres, à anthères jaunes
- Style court
- Capsule glabre, subsessile, à pédicelle égalant à peine la glande

## ○ Floraison : Avril/mai



# Saule cendré

(*Salix cinerea*)

## ○ Description :

- Arbrisseau de 2-6 mètres, à rameaux un peu divariqués, peu anguleux, les jeunes et les bourgeons tomenteux-cendrés
- Bois nu strié en long
- Feuilles assez grandes, pétiolées, obovales ou oblongues-lancéolées, à pointe droite ou un peu déjetée, un peu ondulées, planes, glabres ou pubescentes en dessus, glauques-blanchâtres et à la fin glabrescentes en dessous
- Chatons précoces, oblongs ou cylindriques, denses, subsessiles, à écailles velues, noirâtres au sommet
- Style court
- Capsule tomenteuse, à pédicelle 3-4 fois plus long que la glande polymorphe

## ○ Floraison : Mars/avril




# Saule des vanniers (*Salix viminalis*)

## ○ Description :

- Arbrisseau ou arbuste de 3-10 mètres, à rameaux longs et flexibles, les jeunes et les bourgeons pubescents
- Feuilles pétiolées, longuement lancéolées-acuminées, entières ou ondulées, vertes et glabres en dessus, argentées soyeuses en dessous
- Chatons précoces, oblongs ou cylindriques, denses, sessiles, à écailles velues, noirâtres
- 2 étamines libres et glabres, anthères jaunes
- Style long
- Capsule soyeuse, subsessile, à pédicelle

## ○ Floraison : Mars/avril






# Mégaphorbiaies

# Angélique des bois (*Angélica silvestris*)

## ○ Description :

- Plante bisannuelle ou vivace, dépassant souvent 1 mètre
- Tige glauque ou rougeâtre, épaisse, creuse, striée, rameuse dans le haut
- Feuilles très amples, bi-tripennées, à folioles écartées, grandes, ovales-lancéolées, dentées en scie
- Fleurs blanches ou rosées
- Ombelles grandes, à 20-30 rayons pubescents
- Pétales à pointe dressée
- Fruits longs de 5 mm sur 4 de large, tous de même forme, ovales, à ailes marginales membraneuses, plus ou moins ondulées

## ○ Floraison : Juillet/septembre



# Canche cespiteuse (*Deschampsia cespitosa*)

## Description :

- Plante vivace de 30 cm à 1 m. 50, glabre, à souche densément gazonnante formée de fascicules très tenaces et difficiles à diviser
- Tiges dressées, raides
- Feuilles vertes, planes, larges de 2-5 mm scabres, souvent très longues
- Ligule longue, lancéolée
- Panicule ample, étalée, à axe et rameaux scabres
- Pédicelles plus courts que l'épillet
- Épillets rapprochés, longs de 3-6 mm à 2 (rarement 3-4) fleurs fertiles, violacés ou verdâtres
- Fleur supérieure à pédicellé long de 1 mm
- Arête droite, incluse ou peu saillante, insérée vers la base de la glumelle

**Floraison :** Juin-août



# Epilobe à petites fleurs

(*Epilobium parviflorum*)

## Description :

- Plante de 30-80 cm, dressée, mollement poilue, à souche tronquée, émettant de courtes rosettes de feuilles
- Tige sans lignes saillantes
- Feuilles inférieures et moyennes opposées, oblongues-lancéolées, à peine denticulées, sessiles, non embrassantes
- Fleurs d'un rose pâle, petites (6-7 mm de diam.), toujours dressées, en grappes feuillées
- Bouton floral obtus, à sépales mutiques
- Pétales bilobés
- Dépassant à peine le calice
- 4 stigmates, étalés en croix
- Capsule pubérulente

**Floraison :** Juin-septembre



# Epilobe des marais

(*Epilobium palustre* L.)

## Description :

- Plante de 20-80 cm, dressée ou ascendante, glabrescente, à souche traçante, émettant des stolons souterrains, filiformes, blanchâtres
- Tige arrondie, sans lignes saillantes
- Feuilles opposées, sauf les florales, lancéolées-linéaires, atténuées à la base, sessiles, ordinairement entières et à bords enroulés
- Fleurs rosées, petites (4-6 mm) penchées avant la floraison
- Pétales dépassant peu le calice
- Stigmate en massue
- Graines lisses, prolongées en appendice court portant l'aigrette

Floraison : Juillet/septembre



# Epilobe hirsute

(*Epilobium hirsutum*)

## ○ Description :

- Dépassant souvent 1 mètre, dressée, velue-hérissée, à souche longuement stolonifère
- Tige sans lignes saillantes
- Feuilles oblongues-lancéolées, denticulées, demi-embrassantes, un peu décurrentes
- Fleurs d'un rose pourpre, grandes (environ 2 cm), en entonnoir, toujours dressées, en grappes feuillées
- Bouton floral apiculé par les sépales mucronés
- Pétales égaux, bilobés, 1 ou 2 fois plus longs que le calice
- Etamines et styles dressés
- 4 stigmates étalés en croix
- Capsule pubescente

## ○ Floraison : Juin/septembre



# Eupatoire chanvrine (*Eupatorium cannabinum*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 60-120 cm à tige dressée, simple ou rameuse, souvent rougeâtre, pubescente
- Feuilles opposées à 3-5 segments pétiolulés, lancéolés, dentés, glanduleuses en dessous
- Involucre à folioles intérieures scarieuses, oblongues-linéaires, très obtuses, les extérieures ovales
- Capitules purpurins, en corymbe rameux, terminal, compact

## ○ Floraison : Juillet/août



# Gaillet des marais

(*Galium palustre*)

## Description :

- Plante vivace de 2060 cm, noircissant par la dessiccation, glabre, à souche grêle
- Tiges faibles, diffuses-ascendantes, un peu scabres sur les angles
- Feuilles verticillées par 4-5, oblongues ou linéaires-oblongues, obtuses, mutiques, uninevés, scabres aux bords et à la nervure dorsale
- Fleurs blanches ou rosées, en panicule allongée, diffuse, à rameaux étalés-réfléchis après la floraison
- Pédicelles fructifères divariqués ou réfractés, plus longs que les fruits
- Corolle à lobes ovales-aigus
- Anthères purpurines
- Fruits petites, noirâtres, glabres. Varie à tiges robustes (1m), feuilles, fleurs et fruits plus grands

**Floraison :** Mai-août



# Hydrocotyle commun, Écuelle d'eau

(*Hydrocotyle vulgaris* L.)

## Description :

- Plante vivace de 10-20 cm, à tige très grêle, blanchâtre, rampante, émettant à chaque nœud un faisceau de racines fibreuses, 1-3 feuilles et 1-2 pédoncules
- Feuilles longuement pétiolées, peltées-orbiculaires, crénelées, glabres, à 7-9 nervures rayonnantes
- Fleurs blanches ou rosées, très petites, subsessiles, 4-6 en 1-3 verticilles rapprochés sur des pédoncules axillaires, nus, filiformes, bien plus courts que les pétioles
- Involucre à folioles courtes
- Calice à limbe nul
- Pétales orales, entiers, aigus
- Fruit suborbiculaire un peu plus large que long, échancré au sommet et à la base, comprimé par le côté
- Méricarpes à 5 côtes filiformes, les intermédiaires plus saillantes et arquées

**Floraison :** Juin-septembre




# Liseron des haies (*Calystegia sepium*)

## Description :

- Plante grimpante dont les tiges volubiles peuvent atteindre jusqu'à 5 m de long
- Feuilles, alternes, sagittées (en forme de fer de flèche) à long pétiole, à limbe entier, à pointe aiguë, munies de deux oreillettes à la base
- limbe assez développé peut atteindre 10 cm de large et 15 cm de long
- Fleurs grandes, jusqu'à 6 cm de long, blanches, et isolées sur des rameaux latéraux, portées par un long pédoncule (plus long que la fleur)
- Calice à 5 sépales, recouvert de deux bractées sépaloides
- Corolle en entonnoir formée de cinq pétales concrescents, cinq étamines, l'ovaire supère portant deux stigmates
- Fruits en capsules de forme ovoïde de 10 mm de long, renversés à maturité

**Floraison :** Juin/septembre



# Lysimache vulgaire

(*Lysimachia vulgaris*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, mollement pubescente, à souche rampante-stolonifère
- Tige dressée, robuste, à peine creuse, un peu rameuse, feuillée
- Feuilles grandes, opposées ou verticillées par 3-4, subsessiles, ovales ou oblongues-lancéolées
- Fleurs jaunes, en panicule pyramidale feuillée à la base
- Calice brièvement cilié, à lobes lancéolés-aigus, bordés de rouge
- Corolle glabre, à 5 lobes ovales
- 5 étamines, à filets soudés jusqu'au tiers

## ○ Floraison : Juin/août



# Peucedan des marais, persil des marais (*Peucedanum palustre*)

## Description :

- Plante vivace d'environ 1 mètre, glabre, à souche épaisse, non chevelue
- Tige robuste, cannelée, largement creuse
- Feuilles molles, vertes en dessus, pâles en dessous, à pétiole cylindrique, subcanaliculé, les inférieures 3-4 fois pennatiséquées, découpées en lanières courtes, lancéolées-linéaires, à pointe calleuse
- Fleurs blanches, en ombelles grandes, à 15-30 rayons, pubescents en dedans
- Involucre et involucelle à folioles réfléchies, nombreuses, linéaires-lancéolées, membraneuses aux bords
- Styles plus longs que le stylopode discoïde
- Fruit longuement pédicellé, elliptique, émarginé au sommet, long de 5-6 mm, à bord étroit

Floraison : Juillet/septembre

**Espèce protégée**



# Potentille des oies (*Potentilla anserina* L.)

- **Description :**
  - Plante vivace de 20-40 cm, à tiges rampantes-stolonifères, grêles, axillaires
  - Feuilles imparipennées, à 15-25 folioles oblongues, vertes en dessus ou soyeuses-argentées sur les 2 faces, munies tout autour de dents linéaires-aiguës
  - Stipules caulinares multifides
  - Fleurs d'un jaune doré, grandes (2 cm de diam.), solitaires à l'aisselle des feuilles, longuement pédonculées
  - Calicule à lobes égalant le calice
  - Pétales obovales, non émarginés, 2 fois plus longs que le calice
  - Carpelles lisses
- **Floraison :** Mai-septembre



# Pulicaire dysentérique (*Pulicaria dysenterica*)

## ○ Description :

- Plante vivace à tiges de 30-60 cm dressées, pubescentes-laineuses ou tomenteuses, à rameaux étalés-dressés ou divergents
- Feuilles pubescentes, blanchâtres, laineuses ou tomenteuses en dessous, ondulées, lâchement denticulées, ovales-lancéolées, fortement embrassantes et à oreillettes très prononcées, les supérieures comme sagittées
- Involucre laineux, à folioles linéaires-subulées
- Akènes velus, aigrette rousse
- Capitules portés par des pédoncules grêles, en corymbe
- Fleurs jaunes, celles de la circonférence rayonnantes

## ○ Floraison : Juillet/septembre



# Reine des prés (*Filipendula ulmaria*)

## ○ Description :

- Plante vivace d'environ 1 mètre, à racine munie de fibres non renflées
- Feuilles grandes et très caractéristiques, imparipennées, à 5-9 paires de segments larges, inégaux, sessiles, écartés, doublement dentés, les 3 supérieurs confluent en un seul trilobé, verts ou blancs-tomenteux en dessous
- Stipules demi-circulaires, dentées
- Fleurs blanches, en corymbes à branches très inégales
- Etamines plus longues que les pétales suborbiculaires
- 5-9 carpelles, contournés en spirale les uns autour des autres

## ○ Floraison : Juin/août





# Salicaire commune

*(Lythrum salicaria)*

## ○ Description :

- Plante vivace de 50 cm, à 1 mètre, dressée, robuste, pubescente dans le haut, à souche épaisse
- Feuilles lancéolées, en cœur à la base, sessiles, opposées, rarement verticillées ou les supérieures alternes
- Fleurs d'un rouge violet, grandes (10-12 mm), en faisceaux axillaires simulant des verticilles et formant un long épi terminal, souvent interrompu à la base
- Calice velu, à 12 côtes et dents
- 6 pétales, de moitié plus longs que le calice
- 12 étamines, dont 6 saillantes

## ○ Floraison : Juin/septembre



# Samole de Valérand, Mouron d'eau (*Samolus valerandi*)

## • Description :

- Plante vivace de 20-40 cm, glabre, à souche courte et fibreuse
- Tiges dressées, cylindriques, creuses, peu rameuses
- Feuilles radicales en rosette, les caulinaires alternes, toutes obovales, atténuées en pétiole, entières, d'un vert pâle
- Fleurs blanches, petites (3 mm de diam.), en grappes terminales formant une panicule longue et étroite
- Pédoncules coudés et munis d'une bractéole un peu au-dessus du milieu
- Calice à tube subglobuleux soudé avec l'ovaire, à 5 dents triangulaires
- Corolle en coupe, à tube court, à gorge munie de 5 écailles alternant avec 5 lobes dépassant un peu le calice
- Capsule globuleuse, incluse, s'ouvrant au sommet par 5 valves
- Graines nombreuses

## • Floraison : Juin-août



# Scrofulaire aquatique (*Scrophularia auriculata*)

## Description :

- Plante vivace atteignant 1-2m., glabre ou pubérulente
- Tige robuste, creuse, à 4 angles aigus non ou à peine ailés
- Feuilles auriculées ou lyrées-pennatiséquées, à 3-7 segments inégaux, le terminal beaucoup plus grand, ovales ou lancéolés, inégalement dentés-incisés
- Fleurs d'un brun rougeâtre, subsessiles, en cymes courtement pédonculées, compactes et comme verticillées, bien plus courtes que les entrenœuds
- Calice à lobes arrondis, scarieux et déchirés-frangés
- Corolle de 7-10 mm
- Staminode obovale en coin
- Capsule de 5-7 mm, subglobuleuse-apiculée, Ruisseaux et lieux humides, en Corse

**Floraison :** Juin/septembre



# Stellaire aquatique, Malaquie aquatique (*Myosoton aquaticum*)

- **Description :**

- Plante vivace, pubescente-glanduleuse dans le haut, d'un vert clair
- Tiges de 30-60 cm, décombantes ou grimpantes, fragiles
- Feuilles grandes, ovales-lancéolées, en cœur à la base, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles
- Fleurs assez grandes, en cymes dichotomes lâches et feuillées
- Pédicelles longs, étalés, à la fin courbés
- Bractées foliacées
- Sépales ovales, obtus
- Pétales fendus jusqu'à la base en 2 lobes divergents, 1 fois plus longs que les sépales
- 5 styles, alternes avec les sépales
- Capsule ovoïde, dépassant le calice, à 5 valves bidentées

- **Floraison :** Juin-octobre



A wide-angle photograph of a lush green field of tall grasses, likely a wet prairie. The grasses are vibrant green and appear to be blowing in the wind. In the background, there is a dense line of trees, including several tall, thin trees and some weeping willows. To the right, a few houses with brown roofs are visible, partially obscured by the trees. The sky is blue with some light clouds.

# Prairies humides

# Aconit napel

(*Aconitum napellus* L.)

## Description :

- Racine à tubercules renflés en navet
- Tige atteignant **1 ou 2 mètres**, très feuillée, simple ou rameuse et pubescente dans le haut
- Feuilles profondément palmatisées, à divisions linéaires ou lancéolées
- Fleurs d'un bleu foncé, parfois violacées ou blanches, en grappe allongée ou en panicule, à pédoncules dressés ou un peu étalés
- Sépales pubescents
- Casque convexe-hémisphérique, à bec horizontal
- Follicules 3, glabres à la maturité et appliqués contre l'axe
- Graines ridées sur 1 seule face

Floraison : Juillet-Septembre



# Agrostide stolonifère (*Agrostis stolonifera* L.)

## Description :

- Inflorescence : panicule d'épillets
- Fruit : caryopse
- Couleur de la fleur : vert, rose
- Stolons rampants sur le sol, verts, feuillés, radicants
- Parfois rhizomes souterrains courts et blanchâtres
- Ligules à sommets arrondi

Floraison : Mai/septembre



# Cirse des maraîchers (*Cirsium oleraceum* (L.) Scop.)

- **Description :**
  - Plante vivace de 8-12 cm, dressée, simple ou rameuse au sommet, glabre ou presque glabre, non ailée
  - Feuilles molles, glabres ou glabrescentes, embrassantes à larges oreillettes arrondies, pennatifides, pennatipartites ou lyrées, à segments larges, lancéolés, bordés de petites cils non épineux, les supérieures indivises
  - Involucre ovoïde, à folioles lancéolées-linéaires, dressées, à pointe étalée
  - Capitules terminaux dressés, peu nombreux, rapprochés, à fleurs jaunâtres dépassées par les feuilles florales larges, orales, jaunâtres
- **Floraison :** Juillet-août



# Cirse des marais (*Cirsium palustre* Scop.)

## ○ Description :

- Grande à très grande herbe bisannuelle à **tige** dressée dépassant 1,5 mètre pourvues de haut en bas d'ailes très épineuses
- **Feuilles** allongées, blanchâtres-laineuses en dessous, fortement découpées et épineuses
- **Fleurs** pourpres violacées en capitules. Nombreux petits capitules (1-2 cm) en haut des tiges

**Autres habitats possibles :** Lieux marécageux, bois, tourbières

- **Floraison :** Juillet-septembre



# Consoude officinale (*Symphytum officinale* L.)

## Description :

- Plante vivace de 40 cm à 1 m., velue-hérissée, à souche épaisse, charnue, non tubéreuse
- Tige robuste, ailée, rameuse aux aisselles supérieures
- Feuilles épaisses, ovales-lancéolées, les inférieures plus grandes que les moyennes longuement décurrentes
- Fleurs blanchâtres, rosées ou violettes
- Calice fendu jusque près de la base, à lobes lancéolés
- Corolle d'environ 15 mm, 2 fois plus longue que le calice, à lobes réfléchis
- Écailles incluses, lancéolées en alêne
- Anthères aiguës, un peu plus longues que le filet
- Carpelles lisses, luisants, non contractés au-dessus de la base

**Floraison :** Mai-juillet



# Dactylorhize tacheté

(*Dactylorhiza maculata*)

## Description :

- Plante vivace de 25-60 cm, glabre, à tubercules palmés
- Tige élancée, pleine, nue au sommet
- Feuilles oblongues ou lancéolées, tachées de brun en travers
- Fleurs blanc lilas ou roses, rayées et ponctuées de pourpre, à odeur agréable, en épi cylindracé-conique serré
- Bractées herbacées, nervées en réseau, les inférieures égalant les fleurs, les autres plus courtes
- Divisions extérieures obtuses ou aiguës, les latérales étalées-réfléchies
- Labelle presque plan, trilobé, à lobes latéraux arrondis crénelés, le moyen plus petit
- Éperon dirigé en bas, cylindracé, un peu plus court que l'ovaire

Floraison : Mai-juillet

**Protection CITES internationale**



# Guimauve officinale

(*Althaea officinalis* L.)

## Description :

- Plante vivace, toute veloutée-blanchâtre, à racine épaisse, blanche
- Tiges d'environ 1 mètre, dressées, robustes
- Feuilles tomenteuses, ovales, à 3-5 lobes peu profonds, inégalement dentés
- Fleurs d'un blanc rosé, assez grandes, fascicules sur des pédoncules plus courts que le pétiole
- Calicule à lobes étroits, lancéolés, plus courts que le calice
- Calice à lobes ovales-acuminés, appliqués sur le fruit
- Corolle 2 fois plus longue que le calice, apétales émarginés
- Carpelles tomenteux, à bords obtus

**Floraison :** Juin-septembre



# Iris jaune, faux-acore, des marais

(*Iris pseudacorus*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 40 cm à 1 mètre, glabre, inodore, à rhizome épais
- **Feuilles** en glaive, égalant presque la tige rameuse au sommet et arrondie-comprimée
- **Fleurs** 2-3 par spathe, jaunes, inodores, à pédoncules aussi longs ou plus longs que l'ovaire
- **Périanthe** à tube court, à divisions extérieures non barbues et à onglet court, les intérieures 3 fois plus petites, plus étroites et plus courtes que les stigmates à 2 lobes triangulaires denticulés
- Capsule ellipsoïde-trigone, apiculée, à graines brunâtres

## ○ Floraison : Juillet/août




# Jonc acutiflore, Jonc à fleurs aiguës (*Juncus acutiflorus*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 20 à 80 cm
- Forme d'importants ensembles peu denses
- Feuilles le long de la tige
- Feuilles écartées, dressées, cylindriques – comprimées, noueuses
- Tige cloisonnée, visible par transparence
- Inflorescence en haut de la tige et rameuse
- Fleurs d'un brun-mauve
- Rhizomes longuement traçants

## ○ Floraison : Juin/août



Inflorescence au sommet de la tige





# Jonc aggloméré (*Juncus conglomeratus*)

## Description :

- Plante vivace de 40 à 80 cm
- Tige sans feuille et légèrement striée
- Tige non cloisonnée, à moëlle continue
- Gaines de couleur brun clair en bas de tige
- Inflorescence dans le tiers supérieur
- Fleurs brunâtres et sessiles
- Rhizomes traçants

**Floraison :** Juin/août



# Jonc articulé

(*Juncus articulatus* L.)

## Description :

- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à rhizomes traçants
- Tiges rapprochées, ascendantes ou couchées-radicantes, cylindriques-comprimées, feuillées
- Feuilles cylindriques-comprimées, fortement noueuses
- Fleurs brunâtres ou verdâtres, moyennes, glomérulées par 4-15, en panicule à rameaux étalés et écartés
- Péricarpe à divisions d'égale longueur, les extérieures aiguës, les intérieures obtuses
- 6 étamines, à anthères égalant le filet
- Capsule d'un brun noir luisant, brusquement mucronée, dépassant le péricarpe

**Floraison :** Juin-septembre



© Photoflora – Benoit BOCK




© Photoflora – Benoit BOCK

# Jonc diffus, épars (*Juncus effusus*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 40 à 80 cm
- Touffes denses
- Tige lisse et luisante
- Tige sans feuille
- Tige non cloisonnée, à moëlle continue
- Gaines de couleur rousse en bas de tige
- Inflorescence dans le tiers supérieur de la tige et plus ou moins lâche, groupée
- Rhizomes traçants

## ○ Floraison : Juin/septembre




# Jonc glauque (*Juncus inflexus*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 40 à 80 cm
- Touffes denses
- Tige raide fortement striée, difficile à rompre, moëlle cloisonnée
- Feuilles réduites à des gaines basales d'un pourpre noir luisant
- Inflorescence dans le tiers supérieur de la tige et plus ou moins lâche
- Rhizomes traçants

## ○ Floraison : Juin/août



# Jonc nouveau

*(Juncus subnodulosus)*

## Description :

- Plante vivace de 40-80 cm, glabre, à rhizomes traçants
- Tiges assez grêles, dressées, cylindriques, feuillées
- Feuilles inférieures réduites à des gaines jaunâtres, les supérieures 2, cylindracées, raides, noueuses-cloisonnées
- Fleurs d'un vert jaunâtre, petites, glomérulées par 4-12, en panicule fournie à rameaux divariqués ou réfractés
- Péricarpe à divisions égales, conniventes, obtuses, carénées sur le dos
- 6 étamines, à anthères plus longues que le filet
- Capsule d'un vert roussâtre, atténuée en bec, égalant le péricarpe

**Floraison :** Juin-août



# Laïche à épis rapprochés (*Carex appropinquata*)

## Description :

- Plante vivace de 40-80 cm, glabre, à souche courte gazonnante
- Tige entourée de fibres brunâtres, grêle, trigone, à faces convexes, scabre au sommet
- Feuilles planes, étroites (2-3 mm), scabres
- Inflorescence en panicule étroite, lâche à la base, fauve, formée d'épillets nombreux, ovoïdes, mâles au sommet
- Bractées aristées
- Écailles-ovales aiguës, étroitement scarieuses
- 2 stigmates
- Utricules étalés-dressés, bruns, petites (3 mm), ovales-triangulaires, biconvexes, fortement nervés, à bec court, non bordé, bidenté, égalant l'écaille

Floraison : Avril-juillet




*Carex appropinquata*  
Laïche paradoxale  
Bavonne,  
CHIRENS (38)  
21/05/201

# Laîche à fruits écailleux (*Carex lepidocarpa*)

## Description :

- Plante cespiteuse, à courts rhizomes
- Inflorescence : racème d'épis
- Fruit : akène
- Couleur de la fleur : jaune
- L'épi mâle est longuement pédonculé
- Les épis femelles sont globuleux et souvent espacés
- Les utricules inférieurs se terminent par un bec légèrement recourbé

**Floraison :** Mai à août



# Laîche aiguë (*Carex acuta* L.)

## Description :

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, verte, à souche rampante-stolonifère
- Tige d'abord penchée au sommet, triquète, scabre
- Feuilles souvent plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm scabres, à gaines non filamenteuses
- Épis mâles 2-4, les femelles 3-5, tous allongés, cylindriques, brunâtres, peu écartés, souvent mâles au sommet, sessiles ou l'inférieur pédoncule
- Bractées inférieures sans gaîne, dépassant la tige
- Écailles brunâtres, lancéolées
- 2 stigmates
- Utricules verdâtres, ovales ou elliptiques (3 mm), plans-convexes, nervés, à bec court et entier, dépassant ou non l'écaille

**Floraison :** Avril-juillet



# Laïche bleuâtre (*Carex panicea* L.)

## Description :

- Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche stolonifère
- Tige dressée ou inclinée au sommet, subtrigone, lisse
- Feuilles glauques, larges de 2-4 mm rudes
- Épi mâle solitaire, oblong-linéaire, brunâtre
- 2-3 épis femelles écartés, oblongs-cylindriques, assez lâches, dressés, pédoncules
- Bractées engainantes, foliacées, à gaine étroite et appliquée, à limbe assez long
- Écailles brunes-rougeâtres, ovales-lancéolées
- 3 stigmates
- Utricules olivâtres, ovoïdes-renflés (4 mm), peu nervés, rétrécis en bec court et tronqué dépassant l'écaille

**Floraison :** Mai-juin



# Laïche des marais (*Carex acutiformis*)

## ○ Description:

- Plante vivace de 40 cm à 1,5 mètre, à souche rampante stolonifère
- Tige robuste, trigone, à angles aigus, souche brun-rouge foncé
- Feuilles larges de 4-8 mm
- Bractée inférieure sans gaine, égalant environ la tige

## ○ Floraison : Avril/juin



# Laîche des rives (*Carex riparia* Curt.)

## Description :

- Plante vivace de 50 cm à 1 m. et plus, glaucescente, à souche rampante-stolonifère
- Tige robuste, triquète, à angles rudes ou 1-2 lisses
- Feuilles larges de 6-15 mm scabres
- Épis mâles 3-5, épais, cylindriques-elliptiques, brun foncé, à écailles toutes aristées
- Les femelles 2-4, cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs pédoncules
- Bractée inférieure sans gaine, égalant ou dépassant la tige
- Écailles brunâtres, lancéolées-aristées
- 3 stigmates
- Utricules bruns, glabres, dressés, ovoïdes-coniques (5 mm), convexes sur les 2 faces, nervés, à bec bifide ne dépassant pas l'écaille

**Floraison :** Avril-juin




# Laïche espacée

(*Carex remota* Jusl. Ex L.)

## Description :

- Plante vivace de 30-80 cm, glabre, à souche gazonnante
- Tige grêle, à la fin décombante, obscurément trigone, un peu rude au sommet
- Feuilles longues, étroites (1 à 3 mm), molles, rudes
- Inflorescence en épi très long, très interrompu, verdâtre, formé de 5-10 épillets ovoïdes, mâles à la base, les 3-4 inférieurs très écartés et munis d'une longue bractée foliacée dépassant la tige
- Écailles ovales-aiguës
- 2 stigmates
- Utricules dressés, verdâtres, ovales lancéolés (3-12 mm), plans-convexes, nervés dans le bas, atténués en bec bidenté dépassant un peu l'écaille

**Floraison :** Mai-juillet




# Laîche paniculée (*Carex paniculata*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre et plus, glabre, à souche courte, gazonnante
- Tige entourée de gaines brunâtres, raide, trigone, à faces planes, à angles aigus
- Feuilles planes, larges de 4-6 mm
- Inflorescence en panicule lâche ou compacte, fauve, formée d'épillets très nombreux, ovoïdes
- Fleurs mâles au sommet
- Il forme souvent des touradons

## ○ Floraison : Mai/juillet




# Laîche pendante (*Carex pendula*)

## ○ Description :

- Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, glabre, à souche gazonnante
- Tige robuste, trigone, lisse
- Feuilles allongées, larges de 8-15 mm rudes
- Inflorescence étagée et penchée

## ○ Floraison : Mai/juillet



# Laîche raide

(*Carex elata* All.)

## Description :

- Forme des grosses touffes très denses
- Tige dressée, rêche, à section triangulaire
- 1 à 2 épis mâles jaunes pour 2 à 3 épis femelles blancs par pied
- Fixée
- Non ramifiée
- Peut atteindre une taille de 120 cm

**Floraison :** Avril à juin



# Lotier des fanges

(*Lotus pedunculatus* Cav.)

## Description :

- Plante vivace de 30-80 cm, glabrescente ou velue, à souche rampante-stolonifère
- Tiges creuses, dressées ou ascendantes
- Folioles obovales en coin, glauques en dessous
- Stipules ovales
- Fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation, 6-12 sur des pédoncules épais 3-4 fois plus longs que la feuille
- Calice en cloche, à dents égales, étalées ou réfléchies avant la floraison, lancéolées-linéaires, égalant le tube
- Ailes obovales, à bord inférieur presque droit recouvrant la carène un peu courbée en angle très obtus
- Gousse de 20-30 mm, linéaire-cylindrique, droite

**Floraison :** Juin-septembre



© G. ARNAL

# Lychnis fleur-de-coucou (*Silene flos-cuculi*)

## ○ Description :

- **Plante** herbacée vivace, à souche traçante formant des tiges dressées de 30 à 60 cm de haut, légèrement poilue surtout à la base et un peu visqueuse dans sa partie supérieure
- **Feuilles** glabres contrairement aux tiges, très allongées et terminées en pointes. Les bases des feuilles sont ornées de cils
- **Fleurs** de couleurs rose vif, dont les 5 pétales sont découpés en quatre lanières linéaires divergentes et inégales donnant à la fleur un aspect très particulier
- **Fruits** formant une capsule contenant les graines dans une loge uniques

## ○ Floraison : Mai/août



# Menthe à feuilles rondes

(*Mentha suaveolens*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 35-80 cm, à odeur forte et peu agréable, à poils crépus, ondulés, la plupart rameux
- Stolons érigés
- Tiges dressées
- Feuilles sessiles, ovales-suborbiculaires ou elliptiques, obtuses ou subaiguës, épaisses, ridées-bosselées, crénelées ou dentées, blanchâtres-tomenteuses en dessous
- Fleurs blanches ou rosées, en épis terminaux
- Calice velu, court, en cloche, à gorge nue et non contractée, à 5 dents brièvement triangulaires-lancéolées
- Corolle glabre en dedans
- Carpelles ovoïdes, lisses

## ○ Floraison : Juillet/septembre



# Menthe des champs

(*Mentha arvensis* L.)

## Description :

- Plante vivace de 10-60 cm, plus ou moins velue, à odeur forte
- Tiges dressées ou étalées disposé plus ou moins perpendiculairement par rapport à la tige . Tige étalée = tige couchée
- Ascendantes
- Feuilles toutes pétiolées, ovales-aiguës ou ovales-lancéolées, atténuées à la base, dentées en scie, les florales presque aussi grandes que les autres
- Fleurs rosées, en verticilles tous axillaires, écartés, multiflores, compacts
- Axe floral terminé par un petit faisceau de feuilles
- Calice court, en cloche, velu, à 5 nervures un peu saillantes, à gorge nue, à 5 dents égales, triangulaires-aiguës, à peine plus longues que larges
- Corolle velue en dedans
- Carpelles ovoïdes, lisses

Floraison : Juillet-Octobre




# Mouron délicat (*Anagallis tenella*)

## Description :

- Plante vivace de 5-12 cm, glabre, à racine grêle
- Tiges filiformes-quadrangulaires, couchées-radicantes à la base, redressées au sommet
- Feuilles opposées, un peu pétiolées, petites, suborbiculaires, mucronulées, non ponctuées
- Fleurs d'un rose tendre à veines plus foncées, solitaires sur des pédoncules opposés, capillaires, 2-3 fois plus longs que les feuilles, à la fin recourbés
- Calice à lobes lancéolés-linéaires acuminés, à bords non membraneux
- Corolle en cloche, 2-3 fois plus longue que le calice, à lobes oblongs-obtus ou émarginés, non ciliés-glanduleux
- Capsule petite, environ de la longueur du calice

Floraison : Mai-septembre

**Espèce protégée**



# Pigamon jaune

(*Thalictrum flavum* L.)

## Description :

- Rhizome court ou allongé
- Tige élevée, dépassant souvent 1 mètre, droite, cannelée, creuse, compressible, verte et glabre
- Feuilles plus longues que larges, ovales, bi-tripennatiséquées, à folioles ovales ou oblongues en coin, non globuleuses
- Gaines à oreillettes plus larges qu'elles
- Fleurs jaunâtres, dressées, rapprochées en glomérules denses, formant une panicule corymbiforme compacte
- Étamines dressées, à anthères mutiques
- Carpelles courts, ovoïdes ou arrondis, très obtus, à côtes peu saillantes

Floraison : Juin-Août



# Populage des marais (*Caltha palustris*)

## ○ Description :

- Tige de 20-40 cm, ascendante, creuse, glabre et luisante
- Feuilles longuement pétiolées, en cœur arrondi, crénelées ou dentées, les supérieures sessiles
- Fleurs d'un jaune doré, grandes, ouvertes, solitaires, 5 sépales, pétaloïdes, caducs

## ○ Floraison : Mars/août




# Prêle des boursiers (*Equisetum fluviatile* L.)

## Description :

- Plante vivace, printanière et estivale, robuste
- Tiges toutes semblables, vertes, longues de 50 cm à 1 mètre et plus, lisses, finement striées, sans côtes saillantes, à lacune centrale très grande, simples ou rameuses dans le haut
- Gainés presque aussi larges que longues, étroitement appliquées, à 10-20 dents lancéolées en alêne, brunâtres, non ou à peine bordées de blanc
- Rameaux nuls ou verticillés, simples, pentagones, creux, rarement terminés par un petit épi
- Épi assez gros et court (15-20 mm sur 8-12), dense, ovoïde, obtus. S'hybride avec *E. arvense* pour produire *Equisetum littorale* Kuhl.

**Floraison :** Mai-août




# Prêle des marais (*Equisetum palustre* L.)

## Description :

- Plante vivace, printanière et estivale, grêle
- Tiges toutes semblables, vertes, longues de 25-60 cm, lisses, à 6-8 sillons profonds et autant de côtes saillantes, à lacune centrale aussi petite que celles qui l'entourent
- Gainés vertes, 2 fois plus longues que larges, lâches, à 6-12 dents lancéolées-acuminées, brunes bordées de blanc
- Rameaux assez nombreux, étalés-dressés, simples, tétragones, creux, les supérieurs assez souvent terminés par un épi
- Épi grêle (15-30 mm sur 4-6), lâche, ovoïde-oblong, obtus

**Floraison :** Mai-septembre




# Prêle géante, Prêle ivoire, Grande prêle (*Equisetum telmateia*)

## Description :

- Plante vivace, printanière, très robuste
- Tiges de deux sortes, les fertiles de 20-40 cm, simples, lisses, d'un blanc rougeâtre, paraissant avant les stériles et périssant après la fructification
- Munies de gaines brunes, rapprochées, lâches, en cloche, à 20-30 dents profondes linéaires en alêne
- Épi gros (4-8 cm de long sur 1-2 de large), oblong-cylindrique, obtus
- Tiges stériles de 40 cm à 1 mètre et plus, d'un blanc d'ivoire, tardives, finement striées, lisses, à lacune centrale très grande, à gaines plus courtes et écartées, et à nombreux verticilles de rameaux verts, simples, longs, grêles, pleins, à 8 angles

Floraison : Mars-mai



# Renoncule rampante (*Renunculus repens*)

## ○ Description :

- Tiges de 20-50 cm
- Plus ou moins velues, pluriflores, redressées, munies à la base de rejets rampants et stoloniformes
- Feuilles velues ou glabrescentes, ovales dans leur pourtour, pennatiséquées, à 3 segments larges, trilobés, incisés-dentés, le moyen plus longuement pétiolé
- Pédoncules sillonnés
- Sépales étalés, velus : réceptacle velu
- Carpelles glabres comprimés, bordés, à bec grêle un peu courbé, égalant environ le tiers de leur longueur

## ○ Floraison : Mai/août



# Scirpe des bois

(*Scirpe sylvaticus* L.)

## Description :

- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante
- Tiges solitaires, robustes, dressées, trigones à faces convexes, lisses, feuillées
- Feuilles longues, larges de 8-15 mm, planes, rudes aux bords et à la carène
- Épillets vert noirâtre, petites, courts (3-4 mm), ovoïdes, presque tous sessiles et agglomérés en petites têtes, formant une ample panicule composée non ou peu dépassée par 2-3 bractées
- Écailles obtuses mucronées
- 3 stigmates
- 6 soies scabres égalant l'akène trigone mucroné

Floraison : Mai-août



# Souchet brun

(*Cyperus fuscus*)

## Description :

- Plante annuelle de 5-35 cm, glabre, à racine fibreuse Tiges en touffe, dressées ou étalées, triquètres à faces excavées
- Feuilles linéaires-étroites (2-3 mm), carénées, peu rudes
- Inflorescence en ombelle à 3-7 rayons courts et inégaux ou en tête, dépassée par 1-3 feuilles florales
- Épillets brun noirâtre ou marron, petites (4-8 mm sur 12), rapprochés en têtes, à axe non ailé
- Écailles oblongues subobtusées, mucronulées 2 étamines
- 3 stigmates
- Akène blanchâtre, trigone, un peu plus court que l'écaille

**Floraison :** Juillet-septembre



# Vulpin genouillé

(*Alopecurus geniculatus*)

## Description :

- Plantes herbacées, vivaces,
- Tiges (chaumes) décombantes de 45 cm de long
- Inflorescences en panicules denses, spiciformes

Floraison : Avril-juillet





# Herbiers aquatiques et végétation amphibie

# Ache faux-cresson (*Helosciadium nodiflorum*)

- **Description :**

- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre, glabre, à tiges ascendantes ou couchées, radicanes aux nœuds inférieurs, robustes, creuses, striées, rameuses
- Feuilles pennatiséquées, à segments ovales-lancéolés, inégalement dentés, dépassant les ombelles
- Fleurs d'un blanc un peu verdâtre
- Ombelles sessiles ou à pédoncules plus courts que les rayons, opposées aux feuilles, à 4-12 rayons
- Involucre nul, rarement à 1-2 folioles caduques
- Involucelle à folioles scarieuses-blanchâtres aux bords, persistantes
- Styles étalés, plus longs que le stylopode
- Fruit ovoïde. Varie à tiges grêles de 10-20 cm, ombelles à 3-6 rayons

- **Floraison :** Juin-septembre



# Baldingère faux roseau

(*Phalaris arundinacea*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 80 cm à 1 m. 50, glabre, à souche rampante
- Tige robuste, dressée
- Feuilles larges de 8-16 mm rudes, à gaines presque appliquées
- Ligule membraneuse, contrairement au Roseau où elle est poilue
- Panicule allongée, rameuse, étalée à la floraison puis resserrée, violacée ou d'un vert blanchâtre
- Epillets convexes sur les deux faces
- Glumes lancéolées mucronées, à carène non ailée
- Glumelles glabres et luisantes
- 2 petites écailles ciliées à la base de la fleur

## ○ Floraison : Mai/juillet



# Cresson officinal (*Nasturtium officinale*)

## Description :

- Plante vivace, à saveur piquante, à souche rampante
- Tige de 10-50 cm, radicante à la base, ascendante, épaisse, creuse, rameuse
- Feuilles pennatiséquées, à lobes obovales ou oblongs, le terminal plus grand, arrondi en cœur dans les feuilles inférieures
- Fleurs blanches, en grappe peu fournie
- Sépales verts
- Pétales 2 fois plus longs que le calice
- Siliques étalées, courtes, cylindracées, arquées, plus longues que les pédicelles
- Graines ovoïdes, brunes, ponctuées, sur 2 rangs

**Floraison :** Mai-septembre




# Massette à feuilles étroites

(*Typha angustifolia* L.)

## ○ Description :

- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à tige robuste
- Feuilles larges de 4 à 8 mm, un peu en gouttière dans le bas et convexes en dehors, vertes, dépassant la tige
- Epis séparés par un espace long de 1-4 cm, le mâle à axe garni de poils roux plus longs que les filets
- Epi femelle longuement cylindrique, grêle, à la fin épais de 6-12 mm et brun fauve, à surface filamenteuse, à axe muni de poils blancs spatules et fleurs bractéolées
- Stigmate linéaire en alêne, dépassant les poils
- Fruit en fuseau, s'ouvrant à la fin par une fente longitudinale

## ○ Floraison : Juin/août




# Massette à larges feuilles

*(Typha latifolia)*

## ○ Description :

- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à tige robuste Feuilles largement linéaires (6 à 18 mm), planes, glaucescentes, dépassant la tige
- Epis contigus ou à peine espacés, le mâle à axe garni de poils blanchâtres plus longs que les filets des étamines
- Epi femelle longuement cylindrique, à la fin épais de 2-3 cm et d'un brun noirâtre, à surface écailleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles
- Stigmate lancéolé-spatulé, dépassant les poils du périanthe
- Fruit oblong en fuseau, s'ouvrant à la fin par une fente longitudinale

## ○ Floraison : Juin/août



# Menthe aquatique

(*Mentha aquatica*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 35-80 cm, verte ou rougeâtre, velue-hérissée ou presque glabre, à odeur forte
- Tiges dressées ou ascendantes
- Feuilles toutes assez longuement pétiolées, largement ovales ou ovales-lancéolées, dentées en scie
- Fleurs rosés ou blanches, en verticilles peu nombreux, tous ou les supérieurs rapprochés en têtes terminales globuleuses ou ovoïdes très obtuses
- Calice tubuleux, velu, à nombreuses nervures saillantes, à gorge nue, à 5 dents lancéolées-acuminées
- Corolle velue en dedans
- Carpelles ovoïdes, verruqueux

## ○ Floraison : Juillet/septembre



# Glycérie aquatique

(*Glyceria maxima*)

## Description :

- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à souche rampante
- Tiges très robustes, dressées, feuillées
- Feuilles planes, larges de 10-18 mm scabres, à gaines cylindriques
- Ligule courte, tronquée
- Panicule très ample, très rameuse, dressée-étalée en tous sens
- Épillets longs de 4-8 mm pédicellés, à 4-9 fleurs longues de 3-4 mm
- Glumes inégales, uninervées
- Glumelle inférieure obtuse, à 7-9 nervures très saillantes

Floraison : Juin-août



# Glycérie flottante

(*Glyceria fluitans*)

## Description :

- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre et plus, glabre, à souche rampante
- tiges couchées-radicantes à la base, puis redressées ou nageantes
- Feuilles planes, larges de 5-10 mm un peu rudes, gaines comprimées
- Ligule ovale ou tronquée
- Panicule très longue, unilatérale, lâche, à rameaux très étalés à la floraison puis dressés contre l'axe, les inférieurs réunis par 1-3
- Épillets longs de 15-30 mm pédicellés, à 5-14 fleurs longues de 4-6 mm
- Glumes très inégales, uninervées
- Glumelle inférieure subaiguë, à 7-11 nervures saillantes. Varie à panicule plus ample, à rameaux inférieurs réunis par 3-5, glumelle inférieure arrondie-crênelée (*G. plicata* Fries)
  - à panicule très étroite, glumelle à 7 nervures peu saillantes et à sommet arrondi-crênelé

Floraison : Mai-août



# Lycophe d'Europe

(*Lycopus europaeus*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre, glabrescente ou pubescente, inodore, à souche rampante
- Tige dressée, sillonnée
- Feuilles grandes, courtement pétiolées, ovales-lancéolées, dentées-incisées et souvent pennatifides à la base
- Fleurs blanches ponctuées de rouge, petites, en verticilles axillaires sessiles, écartés, très denses
- Calice en cloche, pubescent, à 10 nervures peu saillantes, à 5 dents égales, à pointe rigide
- Corolle en entonnoir, à tube inclus, à 4 lobes presque égaux, le supérieur un peu échancré

## ○ Floraison : Juillet/septembre





# Roseau commun

(*Phragmites australis*)

## ○ Description :

- Graminée de 3 à 5 m de hauteur
- Feuilles faisant 20–50 cm de long par 2-3 cm de large
- Longues tiges fines ornées d'un plumeau argenté et peut mesurer jusqu'à 3 m de haut
- Sa ligule est poilue, contrairement à la Baldingère où elle est membraneuse
- L'inflorescence est un panicule pourpre de 20 à 50 cm de long

## ○ Floraison : Juillet/septembre



# Rubanier d'eau (*Sparganium erectum*)

## ○ Description :

- Plante herbacée assez haute (50-100 cm)
- Feuilles linéaires
- Inflorescences ramifiées
- Fleurs groupées en capitules globuleux
- Capitules mâles petits, nombreux et des capitules femelles nettement plus grands (de 1 à 4 par rameau)

## ○ Floraison : Juillet/septembre




# Rubanier émergé (*Sparganium emersum*)

## ○ Description :

- Plante vivace de 30-80 cm, glabre, à tige dressée, simple
- feuilles larges de 4-6 mm, fermes, dressées, rarement flottantes, les radicales triquètes à la base, à faces toutes planes
- capitules disposés en grappe simple, les mâles 3-7 sessiles, les femelles 3-4, assez gros (12-15 mm de diam.), les inférieurs pédoncules à pédoncule souvent soudé avec la tige
- Écailles florales dentées ou érodées au sommet
- Stigmates linéaires
- Fruits stipités, larges de 2 mm, oblongs en fuseau, non anguleux, atténués en bec grêle égalant les trois quarts de leur longueur

## ○ Floraison : Juin-août



# Véronique des ruisseaux

(*Veronica beccabunga* L.)

## Description :

- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à souche rampante
- Tiges couchées-radicantes, puis redressées, épaisses, cylindriques, pleines
- Feuilles opposées, courtement pétiolées, ovales ou elliptiques-ovales, obtuses, crénelées-dentées
- Fleurs bleues, petites, en grappes axillaires, opposées, lâches, multiflores
- Pédicelles filiformes, étalés, plus longs que le calice et les bractées
- Calice glabre, a 4 lobes presque égaux, oblongs-lancéolés
- Corolle dépassant peu le calice
- Style de 2 mm à peine
- Capsule suborbiculaire, à peine émarginée, un peu plus courte que le calice

**Floraison :** Mai-septembre



# Véronique mouro- d'eau

(*Veronica anagallis-  
aquatica* L.)

## Description :

- Plante bisannuelle ou vivace de 20-80 cm, à souche rampante
- Tiges un peu couchées-radicantes à la base, épaisses, presque quadrangulaires, creuses
- Feuilles opposées, sessiles et demi-embrassantes, ovales-lancéolées ou lancéolées, aiguës, dentées
- Fleurs d'un bleu pâle ou lilacé, petites, en grappes axillaires, opposées, lâches, multiflores
- Pédicelles fructifères étalés, glabres, plus longs que le calice et les bractées
- Calice glabre, à 4 lobes presque égaux, oblongs-lancéolés
- Corolle dépassant peu le calice
- Style de 1 mm
- Capsule glabre, surborbulaire, à peine émarginée, plus courte que le calice

Floraison : Mai-septembre





# Plantes invasives

# Ailante glanduleux (*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle)

## Description :

- Arbre de taille moyenne qui atteint une hauteur comprise entre 17 et 27 mètres avec un diamètre à hauteur de poitrine d'environ 1 mètre
- Écorce est lisse, gris clair, devenant souvent un peu plus rêche avec les fissures de couleur ocre pâle lorsque l'arbre vieillit
- Rameaux, robustes, lisses à légèrement pubescents, sont rougeâtres ou marron
- Bourgeons sont finement pubescents, en forme de dôme, et partiellement cachés derrière le pétiole
- Feuilles sont caduques, grandes, alternes, pennées, imparipennées, d'odeur désagréable au froissement
- Fleurs petites et groupées en grands panicules pouvant atteindre jusqu'à 50 cm de longueur

**Floraison :** Juillet-septembre



# Amorphe buissonnante (*Amorpha fruticosa*)

## Description :

- Arbuste pouvant atteindre 1 à 4 mètres de haut, voire 6 mètres
- Couronne élargie et peut compter de 1 à 10 tiges. morphologie très variable
- Feuilles, alternes, caduques, composées imparipennées, sont munies d'un pétiole de 2,5 cm de long et de stipules membraneuses ou cartacées de 10 à 30 cm de long
- Les nombreuses folioles (9 à 21) sont de forme elliptique ovale à lancéolée, à l'extrémité mucronée, et mesurent de 2 à 4 cm de long sur 1 à 2 cm de large. Leur limbe est parsemé de glandes translucides à la face inférieure
- Fleurs, odorantes, sont groupées en grappes terminales ou axillaires, denses, spiciformes, dressées, de 7 à 15 cm de long
- Le calice est formé de cinq sépales soudés en tube

**Floraison :** Mai-juin



# Aster lancéolé

(*Symphyotrichum lanceolatum*)

## Description :

- Plante vivace, de 80 à 120 cm de haut
- Tige est dressée, ramifiée, pleine, avec une consistance herbacée, à section ronde, surface cannelée et glabre ou glabrescente
- Feuilles alternes, avec une base simple, entières, lancéolées, non pétiolées avec une base à bords parallèles
- Inflorescence : racème de capitules
- Fruit : akène
- Couleur de la fleur : blanc, jaune

**Floraison :** Août à octobre



# Balsamine de l'Himalaya

(*Impatiens glandulifera* Royle)

## Description :

- Grande plante glabre pouvant atteindre deux mètres de haut
- feuilles nettement dentées sont opposées ou verticillées
- Fleurs sont roses, parfois presque blanches, rouges ou pourpres en grappes lâches, odorantes, à éperon court
- Graines sont contenues dans des capsules allongées qui éclatent à maturité par détente de la tige capsulaire, projetant violemment les graines jusqu'à cinq mètres

**Floraison :** Juillet-septembre



# Bambou commun

*(Bambusa vulgaris)*

## Description :

- Tiges très robustes qui peuvent atteindre 15 mètres de haut et 5 à 9 cm de diamètre, droites et dressées à la base et légèrement tombantes à l'apex
- Entrenœuds, longs de 20 à 30 cm, stries longitudinales et sont de couleur vert foncé dans les populations naturelles
- Entrenœuds de couleur jaunes avec rayures vertes chez le premier et plus courts et plus élargis à la base qu'en général chez le deuxième
- Feuilles typiquement lancéolées et glabres sur les deux faces, mesurent de 10 à 30 cm de long et de 1,3 à 2,5 cm de large
- Inflorescences sont des pseudo-épillets lancéolés et bifides



# Érable negundo (*Acer negundo* L.)

## Description :

- Arbre dioïque pouvant atteindre 15-20m pour un tronc de 50cm de diamètre recouvert d'une écorce rugueuse, gris cendré
- Feuilles opposées, composées imparipennées, 3-7 folioles grossièrement dentées de teinte vert-jaunâtre
- Fruits constitués de 2 samares soudées entre elles, angle très aigu

Floraison : Mars-avril



# Buddleia de David, Arbre aux papillons (*Buddleja davidii*)

## Description :

- Arbuste de 2 à 5 m de hauteur, voire 40 m pour les plus gros, aux tiges anguleuses, veloutées
- Feuilles caduques ou semi-caduques, opposées, vertes ou grisâtes, lancéolées, de 10 à 30 cm de long, dentées, à pétiole court (1–5 mm) Portées par un court pétiole, leur revers est duveteux
- Fleurs disposées en thyrses denses, terminales, de 10 à 75 cm de long. de couleur lilas pâle à violet au centre orangé, à corolles en long tube évasé à l'extrémité en quatre larges lobes
- Fleurs longues de 9 à 11 mm.
- Les quatre étamines fixées à l'intérieur du tube alternent avec les lobes

**Floraison :** Fin juin-début octobre



# Gerbe d'or, Solidage du Canada (*Solidago canadensis*)

## Description :

- 60 jusqu'à 250 cm de haut
- Tige verte dorée et poilue (faiblement à densément pubescente) à partir des premières feuilles
- Inflorescence : racème de capitules
- Couleur de la fleur : jaune
- Fruit : akène

**Floraison :** Août à octobre



# Herbe de la pampa (*Cortaderia selloana* Schult. Et Schult. F.)

## Description :

- Grande graminée pouvant atteindre 4m de hauteur
- Feuilles linéaires d'un vert un peu glauque et coupantes sur leurs tranches qui peuvent atteindre 2m de longueur
- Silhouette caractéristique avec ses inflorescences érigées et ses feuilles denses arquées-retombantes à leur base
- Inflorescence en fin d'été en forme de plumeaux blancs, logs de 80cm à 1m

Floraison : Mars-avril



# Renouée du japon

(*Fallopia japonica*)

## Description :

- Tiges creuses érigées, rougeâtres, semblables à des cannes de bambou, de 1 à 3 m de haut
- Feuilles alternes inférieures largement ovales-triangulaires atteignent 15-20 cm de long et sont brusquement tronquées à la base
- Petites fleurs blanches sont disposées en panicules à l'aisselle des feuilles, épi de cymes triflores
- Fruit : akène

**Floraison :** Fin juillet à septembre



# Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L.)

## Description :

- Arbre portant des rameaux épineux et pouvant atteindre 30m de hauteur
- Écorce de couleur gris-brun, profondément crevassée
- Feuilles composées, imparipennées (nombre impair de folioles), à 3-10 paires de folioles entières mesurant de 2-5 cm de long
- Fleurs blanches, très parfumées, regroupées en longues grappes pendantes de 10-20 cm de long
- Fruits en gousses plates, 5-10 cm

Floraison : Mai-juillet



©MNHN-CBNBP/P.Vahrameev

# Sumac de Virginie

(*Rhus typhina* L.)

## Description :

- Robuste pouvant atteindre 6 à 8m de haut
- Rameaux densément recouverts de poils soyeux
- Un latex blanc s'écoule lors de la section des branches
- Feuilles composées de 11-31 folioles dentées, pouvant atteindre 30 à 50 cm de longueur
- Feuillage vire au rouge l'automne
- Fleurs verdâtres réunis en inflorescence pyramidale dressée qui produit ensuite des fruits velus bordeaux à maturité

Floraison : Juin-juillet



# Index des noms communs

## Boisements humides

Aulne glutineux ( <i>Alnus glutinosa</i> ).....	3
Bourdaine ( <i>Frangula alnus</i> ).....	4
Cardère poilue ( <i>Dispsacus pilotus</i> L.).....	5
Cerisier à grappes, Putiet ( <i>Prunus padus</i> L.).....	6
Circée de Paris ( <i>Circaea lutetiana</i> ).....	7
Fougère des marais ( <i>Thelypteris palustris</i> Schott) ).....	8
Groseillier noir, Cassis ( <i>Ribes nigrum</i> L.).....	9
Groseillier rouge ( <i>Ribes rubrum</i> L.).....	10
Houblon ( <i>Humulus lupulus</i> L.).....	11
Laiteron des marais ( <i>Sonchus palustris</i> L.).....	12
Morelle douce-amère ( <i>Solanum dulcamara</i> L.).....	13
Peuplier blanc ( <i>Populus alba</i> L.).....	14
Peuplier noir ( <i>Populus nigra</i> ).....	15
Ronce bleuâtre ( <i>Rubus caesius</i> L.).....	16
Saule blanc ( <i>Salix alba</i> ).....	17
Saule cendré ( <i>Salix cinerea</i> ).....	18
Saule des vanniers ( <i>Salix viminalis</i> ).....	19

# Index des noms communs

## Mégaphorbiaies

Angélique des bois ( <i>Angélica silvestris</i> ).....	21
Canche cespiteuse ( <i>Deschampsia cespitosa</i> ).....	22
Epilobe à petites fleurs ( <i>Epilobium parviflorum</i> ).....	23
Epilobe des marais ( <i>Epilobium palustre</i> L.).....	24
Epilobe hirsute ( <i>Epilobium hirsutum</i> ).....	25
Eupatoire chanvrine ( <i>Eupatorium cannabinum</i> ).....	26
Gaillet des marais ( <i>Galium palustre</i> ).....	27
Hydrocotyle commun, Écuelle d'eau ( <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.).....	28
Liseron des haies ( <i>Calystegia sepium</i> ).....	29
Lysimaque vulgaire ( <i>Lysimachia vulgaris</i> ).....	30
Peucedan des marais, persil des marais ( <i>Peucedanum palustre</i> ).....	31
Potentille des oies ( <i>Potentilla anserina</i> L.).....	32
Pulicaire dysentérique ( <i>Pulicaria dysenterica</i> ).....	33
Reine des prés ( <i>Filipendula ulmaria</i> ).....	34
Salicaire commune ( <i>Lythrum salicaria</i> ).....	35
Samole de Valérand, Mouron d'eau ( <i>Samolus valerandi</i> ).....	36
Scrofulaire aquatique ( <i>Scrophularia auriculata</i> ).....	37
Stellaire aquatique, Malaquie aquatique ( <i>Myosoton aquaticum</i> ).....	38

# Index des noms communs

## Prairies humides

Aconit napel ( <i>Aconitum napellus</i> L.).....	40
Agrostide stolonifère ( <i>Agrostis stolonifera</i> L.).....	41
Cirse des maraîchers ( <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.).....	42
Cirse des marais ( <i>Cirsium palustre</i> Scop.).....	43
Consoude officinale ( <i>Symphytum officinale</i> L.).....	44
Dactylorhize tacheté ( <i>Dactylorhiza maculata</i> ).....	45
Guimauve officinale ( <i>Althaea officinalis</i> L.).....	46
Iris jaune, faux-acore, des marais ( <i>Iris pseudacorus</i> ).....	47
Jonc acutiflore, Jonc à fleurs aiguës ( <i>Juncus acutiflorus</i> ).....	48
Jonc aggloméré ( <i>Juncus conglomeratus</i> ).....	49
Jonc articulé ( <i>Juncus articulatus</i> L.).....	50
Jonc diffus, épars ( <i>Juncus effusus</i> ).....	51
Jonc glauque ( <i>Juncus inflexus</i> ).....	52
Jonc noueux ( <i>Juncus subnodulosus</i> ).....	53
Laîche à épis rapprochés ( <i>Carex appropinquata</i> ).....	54
Laîche à fruits écailleux ( <i>Carex lepidocarpa</i> ).....	55
Laîche aiguë ( <i>Carex acuta</i> L.).....	56
Laîche bleuâtre ( <i>Carex panicea</i> L.).....	57
Laîche des marais ( <i>Carex acutiformis</i> ).....	58

# Index des noms communs

Laîche des rives ( <i>Carex riparia</i> Curt.).....	59
Laîche espacée ( <i>Carex remota</i> Jusl. Ex L.).....	60
Laîche paniculée ( <i>Carex paniculata</i> ).....	61
Laîche pendante ( <i>Carex pendula</i> ).....	62
Laîche raide ( <i>Carex elata</i> All.).....	63
Lotier des fanges ( <i>Lotus pedunculatus</i> Cav.).....	64
Lychnis fleur-de-coucou ( <i>Silene flos-cuculi</i> ).....	65
Menthe à feuilles rondes ( <i>Mentha suaveolens</i> ).....	66
Menthe des champs ( <i>Mentha arvensis</i> L.).....	67
Mouron délicat ( <i>Anagallis tenella</i> ).....	68
Pigamon jaune ( <i>Thalictrum flavum</i> L.).....	69
Populage des marais ( <i>Caltha palustris</i> ).....	70
Prêle des borbiers ( <i>Equisetum fluviatile</i> L.).....	71
Prêle des marais ( <i>Equisetum palustre</i> L.).....	72
Prêle géante, Prêle ivoire, Grande prêle ( <i>Equisetum telmateia</i> ).....	73
Renoncule rampante ( <i>Renunculus repens</i> ).....	74
Scirpe des bois ( <i>Scirpe sylvaticus</i> L.).....	75
Souchet brun ( <i>Cyperus fuscus</i> ).....	76
Vulpin genouillé ( <i>Alopecurus geniculatus</i> ).....	77

# Index des noms communs

## Herbiers aquatiques et végétation amphibie

Ache faux-cresson ( <i>Helosciadium nodiflorum</i> ).....	79
Baldingère faux roseau ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) .....	80
Cresson officinal ( <i>Nasturtium officinale</i> ) .....	81
Massette à feuilles étroites ( <i>Typha angustifolia</i> L.) .....	82
Massette à larges feuilles ( <i>Typha latifolia</i> ) .....	83
Menthe aquatique ( <i>Mentha aquatica</i> ).....	84
Glycérie aquatique ( <i>Glyceria maxima</i> ).....	85
Glycérie flottante ( <i>Glyceria fluitans</i> ) .....	86
Lycoper d'Europe ( <i>Lycopus europaeus</i> ) .....	87
Roseau commun ( <i>Phragmites australis</i> ) .....	88
Rubaniér d'eau ( <i>Sparganium erectum</i> ).....	89
Rubaniér émergé ( <i>Sparganium emersum</i> ) .....	90
Véronique des ruisseaux ( <i>Veronica beccabunga</i> L.).....	91
Véronique mouron-d'eau ( <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.) .....	92

# Index des noms communs

## Plantes invasives

Ailante glanduleux ( <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle).....	94
Amorphe buissonnante ( <i>Amorpha fruticosa</i> ).....	95
Aster lancéolé ( <i>Symphotrichum lanceolatum</i> ).....	96
Buddleia de David, Arbre aux papillons ( <i>Buddleja davidii</i> ).....	97
Balsamine de l'Himalaya ( <i>Impatiens glandulifera</i> Royle).....	98
Bambou commun ( <i>Bambusa vulgaris</i> ).....	99
Érable negundo ( <i>Acer negundo</i> L.).....	100
Gerbe d'or, Solidage du Canada ( <i>Solidago canadensis</i> ).....	101
Herbe de la pampa ( <i>Cortaderia selloana</i> Schult. Et Schult. F.).....	102
Renouée du japon ( <i>Fallopia japonica</i> ).....	103
Robinier faux acacia ( <i>Robinia pseudoacacia</i> L.).....	104
Sumac de Virginie ( <i>Rhus typhina</i> L.).....	105